

Protect Babies from Hepatitis B for Life

What Can I Do to Protect My Baby from Hepatitis B?



DURING PREGNANCY

Adults infected with hepatitis B may not have symptoms. Make sure you get tested for hepatitis B:

- During pregnancy.
- Upon admission for delivery of your baby.

AT BIRTH

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that all newborns receive the hepatitis B vaccine birth dose.

Ask your doctor to make sure your baby gets the first dose of hepatitis B vaccine at birth.

- If you have hepatitis B, ask your doctor to give your baby hepatitis B immune globulin (HBIG) and the first dose of hepatitis B vaccine at birth.



FOLLOW UP WITH YOUR DOCTOR

If you have hepatitis B:

- Your baby needs hepatitis B immune globulin (HBIG) and the first dose of hepatitis B vaccine at birth.
- Complete the hepatitis B vaccine series at: **1 to 2 months, and 6 months.**
- Your baby will need a blood test after the three (3) doses of vaccine to be sure they are protected.



Perinatal Hepatitis B Prevention Program
www.TexasPerinatalHepB.org
(800) 252-9152

Proteja de por vida a los bebés contra la hepatitis B

¿Qué puedo hacer para proteger a mi bebé contra la hepatitis B?



DURANTE EL EMBARAZO

Los adultos infectados con hepatitis B podrían no presentar síntomas. Asegúrese de hacerse la prueba de la hepatitis B:

- Durante el embarazo.
- Al momento de la admisión para el parto de su bebé.

AL NACER

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los bebés reciban en sus primeras horas de vida la dosis para recién nacidos de la vacuna contra la hepatitis B.

Pídale a su médico que se asegure de que su bebé reciba la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer.

- Si usted tiene hepatitis B, pídale a su médico que le administre a su bebé la inmunoglobulina antihepatitis B (HBIG) y la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer.



SEGUIMIENTO CON SU MÉDICO

Si tiene hepatitis B:

- Su bebé necesita inmunoglobulina antihepatitis B (HBIG) y la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer.
- Complete la serie de vacunas contra la hepatitis B a los: **1 a 2 meses** de haber recibido la primera dosis al nacer, y luego a los **6 meses**.
- Su bebé necesitará un análisis de sangre después de las tres (3) dosis de la vacuna para asegurarse de que está protegido.



Perinatal Hepatitis B Prevention Program

www.TexasPerinatalHepB.org

(800) 252-9152